

# VÆVSPRØVE FRA LIVMODERHULEN

## Hvad er en vævsprøve fra livmoderhulen?

Ved en vævsprøve (biopsi) fra livmoderhulen suges lidt væv ud ved hjælp af et undertryk (vakuum). Indgrebet kan evt. ske i lokalbedøvelse, og de fleste mærker enten ingenting eller let ubehag.

## Hvorfor tager vi en vævsprøve?

Det sker, at menstruationen skifter karakter, styrke og varighed, især når man er over 40 år. Det kan også være, at du pletbløder mellem dine menstruationer eller ved samleje. Det skyldes oftest hormonforstyrrelser eller godartede lidelser som fx en polyp (udvækst) enten på livmoderhalsen eller inde i selve livmoderhulen.

For kvinder, der endnu ikke er gået i overgangsalder, skyldes blødningsforstyrrelser sjældent noget farligt. Ældre kvinder, der begynder at bløde efter overgangsalderen, bør som regel få foretaget en vævsprøve fra livmoderhulen.

## Hvordan tager vi vævsprøven?

Vi foretager først en gynækologisk undersøgelse og en ultralydsscanning. Det er sjældent nødvendigt med lokalbedøvelse af livmoderhalsen ifm. prøvetagningen, men for nogle kan det være en god idé.

Vi tager prøven ved at føre et tyndt plastikrør ind i livmoderhulen. Her løsner vi en lille smule væv fra slimhinden og suger det ud. Vævsprøven sendes til mikroskopisk undersøgelse på et speciallaboratorium.

## Skal du sygemelde dig efter en vævsprøve?

Nej. Du kan evt. tage fri resten af dagen, men du er hurtigt frisk igen. Det er normalt at pletbløde i dagene efter vævsprøven.

Hvis du begynder at bløde meget, eller hvis du får stærke smerter eller feber (over 38°C), skal du kontakte klinikken i åbningstiden eller akuttelefonen i din region (i Region Hovedstaden er det tlf.: 1813) udenfor klinikkens åbningstid.

## Hvornår får du svar på prøven?

Vi skriver en e-mail til dig via lægevejen med svaret på vævsprøven og en plan for dig, hvis ikke det allerede blev aftalt ved konsultationen.