

VÆVSPRØVER FRA LIVMODERHALSEN

Hvorfor tager man vævsprøver fra livmoderhalsen?

Hvis din celleprøve har vist mistanke om celleforandringer, hvis du har oplevet blødning efter samleje, eller hvis du er smittet med HPV, vil du blive tilbudt en undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen - også kaldet en KBC:

- K = Koloskopi - en kikkertundersøgelse af din livmoderhals
- B = Biopsi - vævsprøver fra din livmoderhals
- C = Cervikalskrab - skrab fra indersiden af din livmoderhalskanal

Hvad betyder celleforandringer?

Når der ses celleforandringer, betyder det, at cellerne ikke ser normale ud, når man kigger på dem i et mikroskop. Du bør vide, at celleforandringer er *ikke* det samme som kræft. Ofte skyldes de blot en betændelse, som forsvinder af sig selv igen. Forandringerne kan dog være forstadier til livmoderhalskræft, og derfor er det vigtigt at lave en KBC.

Efter vævsprøven

Nogle gange kan vævsprøverne bløde lidt mere end andre gange, og for at standse blødningen lægger vi en gazestrimmel ind i skeden. Hvis du har fået oplagt en gaze, vil lægen informere dig om, at du selv skal fjerne den efter 4 timer. Du trækker blot i enden. Hvis den føles tør og ubehagelig, kan du evt. gøre den våd under bruseren. Du kan få lidt frisk blødning umiddelbart efter og senere lidt brunligt udflåd, men blødningen skal være aftagende og mindre end en menstruation. For at forebygge kraftig blødning, er det vigtigt, at du holder dig i ro i de første 7-10 dage. Derfor skal du undgå at få pulsen op og foretage tunge løft. Så længe du bløder, skal du også undgå:

- Karbad, havbad, SPA og svømmehal
- Tampon - brug helst kun bind
- Samleje

Du bør kontakte os, egen læge eller den regionale akutte telefon, hvis du efter prøven oplever:

- Kraftig blødning
- Ildelugtende udflåd
- Feber over 38°

Prøvesvar

Du vil modtage svar og en plan via e-mail i løbet af ca. 14 dage. Hvis prøverne viser moderate eller svære celleforandringer, vil vi formentlig tilbyde dig en tid til et keglesnit.

Hvad er et keglesnit, hvordan foregår det, og hvorfor tages det?

Et keglesnit er et indgreb, hvor man udskærer et trekantet vævsstykke fra livmoderhalsen (deraf navnet keglesnit). Indgrebet foregår i lokalbedøvelse, og keglen udskæres med en lille el-slynge. Formålet er at fjerne alle celleforandringer fra livmoderhalsen. Du vil få svar på undersøgelsen efter ca. 14 dage, og vi planlægger en screening for livmoderkræft (SMEAR) 6 måneder efter indgrebet.

Hvor kan du læse mere?

I vores patientvejledning "Celleforandringer (celle- og vævsprøver)"

<https://hvp-info.dk/>